

Tabelle 1: Impfkalender (Standardimpfungen) für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Impfung	Alter in Wochen	Alter in Monaten					Alter in Jahren								
	6	2	3	4	11–14	15–23	2–4	5–6	9–14	15–16	17	ab 18	ab 60		
Tetanus		G1	G2	G3	G4	N	N	A1	A2		N	A (ggf. N) ^e			
Diphtherie		G1	G2	G3	G4	N	N	A1	A2		N	A (ggf. N) ^e			
Pertussis		G1	G2	G3	G4	N	N	A1	A2		N	A (ggf. N) ^e			
Hib <i>H. influenzae</i> Typ b		G1	G2 ^c	G3	G4	N	N								
Poliomyelitis		G1	G2 ^c	G3	G4	N	N		A1		N	ggf. N			
Hepatitis B		G1	G2 ^c	G3	G4	N	N								
Pneumokokken ^a		G1		G2	G3	N								S ^g	
Rotaviren	G1 ^b	G2	(G3)												
Meningokokken C						G1 (ab 12 Monaten)		N							
Masern						G1	G2	N							S ^f
Mumps, Röteln						G1	G2	N							
Varizellen						G1	G2	N							
Influenza														S (jährlich)	
HPV Humane Papillomviren														G1 ^d G2 ^d N ^d	

Erläuterungen

- G Grundimmunisierung (in bis zu 4 Teilimpfungen G1–G4)
- A Auffrischimpfung
- S Standardimpfung
- N Nachholimpfung
(Grund- bzw. Erstimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)

- a Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen.
- b Die 1. Impfung sollte bereits ab dem Alter von 6 Wochen erfolgen, je nach verwendetem Impfstoff sind 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mindestens 4 Wochen erforderlich.
- c Bei Anwendung eines monovalenten Impfstoffes kann diese Dosis entfallen.
- d Standardimpfung für Mädchen **und Jungen** im Alter von 9–14 Jahren mit 2 Impfstoffdosen im Abstand von mindestens 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter > 14 Jahren oder bei einem Impfabstand von < 5 Monaten zwischen 1. und 2. Dosis ist eine 3. Dosis erforderlich (Fachinformation beachten).
- e Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Die nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.
- f Einmalige Impfung mit einem MMR-Impfstoff für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit.
- g Impfung mit dem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff.